

¿CÓMO NO SE TRANSMITE EL VIH?

Muchas veces la gente no está bien informada y tiene temores infundados sobre la transmisión del VIH. Así que es importante conocer que el VIH **NO SE TRANSMITE** por:

- Convivir en una misma casa,
- Utilizar los mismos servicios higiénicos,
- Besos, caricias, abrazos o cualquier tipo de contacto corporal que no sea relaciones sexuales.

Según la Dirección General de Epidemiología del MINSA, las proporciones hombre / mujer para los casos de SIDA era de 3,48 al mes de septiembre del 2007. El perfil de la epidemia ha mostrado cambios en la medida que se ha reducido la razón hombre-mujer desde 11,5 a 1 en 1990 hasta un nivel estable de aproximadamente 3 a 1 en los últimos ocho años (2,5 en el 2001, 3,4 en el 2004, 2,7 en el 2005 y 2,8 en el 2006). Esto significa que al inicio de los noventa, para cada mujer con SIDA, había 11 hombres con SIDA. Hoy, por cada mujer con SIDA, existen tres hombres con SIDA.

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un problema de salud pública de la mayor importancia y uno de los desafíos más grandes para la vida y la dignidad de los seres humanos a nivel mundial¹, situación a la cual no es ajeno el Perú. Afecta a todos los países, en particular a los países en desarrollo, y todas las poblaciones en general, aunque algunos segmentos marginados y estigmatizados —como los hombres que tienen sexo con hombres (HSH), los usuarios y usuarias de drogas y los trabajadores y trabajadoras sexuales (TS) — son los grupos más expuestos y más vulnerables, como lo muestran sus elevados índices de prevalencia e incidencia al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Además, las mujeres, los jóvenes, los niños y las niñas pueden tener vulnerabilidades particulares, aunque éstas aún no se traducen en índices elevados de prevalencia o incidencia de VIH en el Perú.

¹ Se estima que a final de 2007 había 33,2 millones [30,6-36,1 millones] de personas en todo el mundo que vivían con el VIH, que en el transcurso del año 2007, 2,5 millones [1,8–4,1 millones] contrajeron la infección por el VIH, y que 2,1 millones [1,9-2,4 millones] perdieron la vida a causa del SIDA. (AIDS Epidemic Update – December 2007– UNAIDS and WHO – www.unaids.org).